AGROVIT LS

Adriatica

CURA E PREVIENE LE MICROCARENZE
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

AGROVIT LS è costituito da un equilibrato complesso di microelementi, formulati sotto forma di sali sequestrati. La sua applicazione previene e cura le più diffuse fisiopatie da microcarenze e induce, a livello vegetativo, un'azione di stimolo sull'attività metabolica della pianta. Questo si traduce in un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione ed in una maggiore resistenza della pianta agli stress abiotici.

COLTURA	MOMENTO DI APPLICAZIONE	DOSE/ETTARO*
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno), Drupacee (Nettarina, Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio), Olivo, Vite, Agrumi (Mandarino, Limone, Arancio, Bergamotto, Clementina) e Actinidia	Nelle prime fasi vegetative o comunque ai primi sintomi carenziali: 3 trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni	1-2 Kg
Orticole da frutto (Zucca, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Melone, Melanzana, Cetriolo, Anguria)	Nelle prime fasi vegetative o comunque ai primi sintomi carenziali: 3 trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni	2-3 Kg
Colture floricole ed ornamentali	Nelle prime fasi vegetative o comunque ai primi sintomi carenziali: 3 trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni	2-3 Kg
Colture industriali (Tabacco, Soia, Pomodoro da industria, Girasole, Cotone, Colza, Canna da zucchero, Barbabietola)	Nelle prime fasi vegetative o comunque ai primi sintomi carenziali: 3 trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni	2-3 Kg

COMPOSIZIONE	
Boro (B) solubile in acqua	0.60%
Rame (Cu) solubile in acqua	0.20%
Rame (Cu) chelato con EDTA	0.20%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0.50%
Ferro (Fe) chelato con o/o EDDHA	0.12%
Ferro (Fe) chelato con o/p EDDHA	0.38%
Manganese (Mn) solubile in acqua	2.10%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	2.10%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0.20%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1.50%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	1.50%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
LIQUIDO	
pH (sol 1%)	8.5
Conducibilità E.C. µS/cm (1‰)	205
Densità (g/cm^3)/Peso specifico	1.26
MODO D'USO	Concimazione Fogliare

CONFEZIONE: 1 - 6 - 12 KG

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.