

COLTURE	MOMENT DE LA DEMANDE	DOSE FOGLIARE*	DOSE DE FERTIRRIGATION*
Vigne	3 applications : bourgeons de 5-10 cm, pré-floraison, raisin de 4-6 mm de diamètre	3-4 kg	4-8 kg
Kiwi	3-4 applications : dès la pré-floraison, à répéter tous les 15 jours	3-4 kg	4-8 kg
Agrumes (Mandarinier, Citronnier, Clémentine, Bergamotier, Oranger)	3-4 applications : dès la pré-floraison, à répéter tous les 10-14 jours	3-4 kg	4-8 kg
Pomacées (Cognassier, Pommier, Poirier)	Préfloraison, chute des pétales, grossissement des fruits à partir de 20 mm de diamètre : applications tous les 10-15 jours	3-4 kg	4-8 kg
Drupacées (Prunier, Pêcher, Nectarine, Cerisier, Abricotier)	4-6 applications : de la floraison à la véraison, à répéter tous les 15 jours	3-4 kg	4-8 kg
Fraise	Faire tremper les semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage Dès le début de la floraison : 2-3 applications à intervalles de 15-20 jours	3-4 kg	4-8 kg
Fruits à coque	Dès la floraison de l'inflorescence femelle : 3-5 applications tous les 15 jours	3-4 kg	4-8 kg
Légumes-fruits (Pastèque, Potiron, Courgette, Tomate, Poivron, Melon, Aubergine, Concombre)	Dans la pépinière : appliquer sur les semis une fois par semaine pendant 2-3 fois ; faire tremper le plateau de semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage. Dans le champ : à partir de 15 jours après le repiquage, 2-4 applications à 15 jours d'intervalle	2-3 kg	3-6 kg
Cultures horticoles diverses (Poireau, Fenouil, Oignon, Chou-fleur, Chou, Carotte, Brocoli, Ail)	Dans la pépinière : appliquer sur les semis une fois par semaine pendant 2-3 fois ; faire tremper le plateau de semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage. Dans le champ : à partir de 15 jours après le repiquage, 2-4 applications à 15 jours d'intervalle	2-3 kg	3-6 kg
Légumes à feuille (épinard, Céleri, Scarole, Roquette, Salade rouge, Laitue, Chicorée)	Dans la pépinière : appliquer sur les semis une fois par semaine pendant 2-3 fois ; faire tremper le plateau de semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage. Dans le champ : à partir de 15 jours après le repiquage, 2-4 applications à 15 jours d'intervalle	2-3 kg	3-6 kg
Légumineuses (Haricots, Lentilles, Petits pois)	4 applications : 3 à 5 feuilles, préfloraison, pleine floraison et au développement de la gousse	2-3 kg	3-6 kg
Fruits rouges (Groseilles, Mûres, Myrtilles, Framboises)	Dès la pre-floraison: 3-4 applications tous les 15 jours	2-3 kg	3-6 kg

COMPOSITION	
Carbone (C) d'origine biologique	1.00%

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	
pH (sol 1%)	4.4
Conductivité E.C. $\mu\text{S}/\text{cm}$ (1‰)	15
Densité (g/cm^3)/Poids spécifique	1 ($\pm 0,05$)

EMBALLAGE: 5 KG