eK-lon MAX

AMÉLIORE LA RÉSISTANCE AU STRESS

ek-lon MAX est un extrait des frondes de l'algue Ecklonia maxima. L'extrait possède des propriétés biostimulantes qui rendent les plantes et les cultures plus tolérantes au stress environnemental, en particulier à la sécheresse. Ek-lon MAX est produit uniquement à partir de frondes et à une température contrôlée. Ce processus permet de préserver tous les composants bioactifs tels que les polysaccharides, les polyphénols et les hormones naturelles. Tous ces composés agissent ensemble pour stimuler la croissance des racines qui, à leur tour, améliorent l'absorption de l'eau et des nutriments, avec des effets bénéfiques sur le stress hydrique et thermique. Les applications d'ek-lon MAX par voie foliaire et par fertigation protègent les cultures contre le stress, avec des effets positifs sur le rendement et la qualité des produits.

BIOSTIMULANT CE CERTIFIÉ PAR L' AGENCE COD. NANDO 2832 AVEC N° CERT.: DE.3761

COLTURE	MOMENT DE LA DEMANDE	DOSE FOGLIARE*	DOSE DE FERTIRRIGATION*
Légumes-fruits (Pastèque, Concombre, Aubergine, Melon, Poivron, Tomate, Courgette, Potiron)	Dans la pépinière : appliquer sur les semis une fois par semaine pendant 2-3 fois ; faire tremper le plateau de semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage. Dans le champ : à partir de 15 jours après le repiquage, 2-4 applications à 15 jours d'intervalle	200-300 g/hl	3-6 kg
Cultures horticoles diverses (Ail, Brocoli, Carotte, Chou, Chou-fleur, Oignon, Fenouil, Poireau)	Dans la pépinière : appliquer sur les semis une fois par semaine pendant 2-3 fois ; faire tremper le plateau de semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage. Dans le champ : à partir de 15 jours après le repiquage, 2-4 applications à 15 jours d'intervalle	200-300 g/hl	3-6 kg
Légumes à feuille (Chicorée, Laitue, Salade rouge, Roquette, Scarole, Céleri, épinard)	Dans la pépinière : appliquer sur les semis une fois par semaine pendant 2-3 fois ; faire tremper le plateau de semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage. Dans le champ : à partir de 15 jours après le repiquage, 2-4 applications à 15 jours d'intervalle	200-300 g/hl	3-6 kg
Olivier e Vigne	3 applications : bourgeons de 5-10 cm, pré-floraison, raisin/drupe de 4-6 mm de diamètre	300-400 g/hl	4-8 kg
Kiwi	3-4 applications : dès la pré-floraison, à répéter tous les 15 jours	300-400 g/hl	4-8 kg
Agrumes (Oranger, Bergamotier, Clémentine, Citronnier, Mandarinier)	3-4 applications : dès la pré-floraison, à répéter tous les 10-14 jours	300-400 g/hl	4-8 kg
Pomacées (Cognassier, Pommier, Poirier)	Préfloraison, chute des pétales, grossissement des fruits à partir de 20 mm de diamètre : applications tous les 10-15 jours	300-400 g/hl	4-8 kg
Drupacées (Abricotier, Cerisier, Nectarine, Pêcher, Prunier)	4-6 applications : de la floraison à la véraison, à répéter tous les 15 jours	300-400 g/hl	4-8 kg
Fraise	Faire tremper les semis dans une solution 1 : 100 avant le repiquage Dès le début de la floraison : 2-3 applications à intervalles de 15-20 jours	300-400 g/hl	4-8 kg
Fruits à coque	Dès la floraison de l'inflorescence femelle : 3-5 applications tous les 15 jours	300-400 g/hl	4-8 kg
Légumineuses (Haricots, Lentilles, Petits pois)	4 applications : 3 à 5 feuilles, préfloraison, pleine floraison et au développement de la gousse	200-300 g/hl	3-6 kg
Fruits rouges (Framboises, Myrtilles, Mûres, Groseilles)	Dès la pre-floraison: 3-4 applications tous les 15 jours	200-300 g/hl	3-6 kg

COMPOSITION	
Carbone (C) d'origine biologique	1.00%

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	
LIQUIDE	
pH (sol 1%)	4.4
Conductivité E.C. µS/cm (1‰)	15
Densité (g/cm^3)/Poids spécifique	1 (±0,05)

EMBALLAGE: 5 KG

NOTE: Les doses ci-dessus se réfèrent à l'utilisation de volumes de pulvérisation de 1000 L/ha (Volumes normaux).
Dans le cas de volumes différents, pour l'utilisation de pulvérisateurs à faible volume ou à récupération de volume, où, pour un mouillage correct de la végétation, une quantité d'eau inférieure aux volumes normaux (VN) peut être suffisante, il est suggéré de se référer à la dose de 200-400 gr par hectolitre (gr/hL).

Le choix de la dose est subordonné à divers facteurs et peut être modifié si nécessaire. Toutes les applications peuvent être répétées en fonction des différents besoins des cultures. Vous pouvez contacter notre service technique pour connaître l'application correcte sur sols et conditions climatiques spécifiques.