eK-lon MAX

MIGLIORA LA RESISTENZA AGLI STRESS

eK-lon MAX è un estratto naturale di Ecklonia maxima con proprietà biostimolanti, ideato per migliorare la tolleranza delle piante agli stress ambientali, in particolare la siccità. Prodotto utilizzando le sole fronde dell'alga e con un rigoroso controllo della temperatura, preserva tutte le componenti bioattive come polisaccaridi, polifenoli e fitormoni naturali. Questi agiscono insieme per stimolare la crescita radicale e aumentare l'assorbimento di acqua e nutrienti, migliorando la resistenza agli stress idrici e termici. L'applicazione di eK-lon MAX, per via fogliare o fertirrigazione, protegge le piante dagli effetti dello stress, incrementando resa e qualità del raccolto.

BIOSTIMOLANTE CE CERTIFICATO DALL'ENTE COD. NANDO 2832 CON N° CERT.: DE.3761

COLTURA	MOMENTO DI APPLICAZIONE	DOSE FOGLIARE*	DOSE FERTIRRIGAZIONE*
Orticole da frutto (Anguria, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchino, Zucca)	In vivaio: applicare sulle piantine una volta alla settimana per 2-3 volte, immergere il vassoio delle piantine in una soluzione 1:100 prima del trapianto In campo: a partire da 15 giorni dopo il trapianto 2-4 trattamenti ad intervalli di 15 giorni	200-300 g/ettolitro	3-6 kg
Orticole varie (Aglio, Broccolo, Carota, Cavolo, Cavolfiore, Cipolla, Finocchio, Porro)	In vivaio: applicare sulle piantine una volta alla settimana per 2-3 volte, immergere il vassoio delle piantine in una soluzione 1:100 prima del trapianto In campo: a partire da 15 giorni dopo il trapianto 2-4 trattamenti ad intervalli di 15 giorni	200-300 g/ettolitro	3-6 kg
Orticole da foglia (Cicoria, Lattuga, Radicchio, Rucola, Scarola, Sedano, Spinacio)	In vivaio: applicare sulle piantine una volta alla settimana per 2-3 volte, immergere il vassoio delle piantine in una soluzione 1:100 prima del trapianto In campo: a partire da 15 giorni dopo il trapianto 2-4 trattamenti ad intervalli di 15 giorni	200-300 g/ettolitro	3-6 kg
Olivo e Vite	3 trattamenti: germogli di 5–10 cm, pre-fioritura, 4–6 mm di diametro dell'acino/drupa	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Actinidia	3-4 trattamenti: a partire dalla pre-fioritura, ripetere ad intervalli di 15 giorni	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Agrumi (Arancio, Bergamotto, Clementina, Limone, Mandarino)	3-4 trattamenti: a partire dalla pre-fioritura, ripetere ad intervalli da 10 a 14 giorni	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Pomacee (Cotogno, Melo, Pero)	Pre-fioritura, caduta petali, ingrossamento frutto a partire dal diametro di 20 mm. Intervalli di applicazione di 10-15 giorni	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarina, Pesco, Susino)	4-6 trattamenti: dalla fioritura all'invaiatura, ad intervalli di 15 giorni	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Fragola	Immergere le piantine in una in una soluzione 1:100 prima del trapianto. Da inizio fioritura 2-3 trattamenti ad intervalli di 15-20 giorni	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Frutti a guscio	Dalla fioritura dell'infiorescenza femminile 3-5 trattamenti ad intervalli di 15 giorni	300-400 g/ettolitro	4-8 kg
Leguminose (Fagioli, Lenticchie, Piselli)	4 trattamenti: a 3 a 5 foglie, pre-fioritura, piena fioritura e allo sviluppo del baccello	200-300 g/ettolitro	3-6 kg
Piccoli frutti (Lamponi, Mirtilli, More, Ribes)	Da pre-fioritura 3-4 trattamenti, da ripetere ogni 7-10 giorni	200-300 g/ettolitro	3-6 kg

COMPOSIZIONE	
Carbonio (C) di origine biologica	1.00%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
LIQUIDO	
pH (sol 1%)	4.4
Conducibilità E.C. µS/cm (1‰)	15
Densità (g/cm^3)/Peso specifico	1 (±0,05)

CONFEZIONE: 5 KG

NOTA: Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi di irrorazione di 1000 L/ha (Volumi Normali).
In caso di volumi diversi, per l'impiego con irroratrici a basso volume o a recupero di volume, ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, possono essere sufficienti una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN), si suggerisce di fare riferimento alla dose di 200-400 gr per ettolitro (gr/hL).

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.