KODENS Cu

ATTIVA I MECCANISMI NATURALI DI RESISTENZA
FAVORISCE I PROCESSI DI CICATRIZZAZIONE
AUMENTA LA RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ AMBIENTALI E PARASSITARIE
MASSIMA EFFICACIA A DOSI RIDOTTE DI RAME
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

KODENS Cu è una specialità nutrizionale formulata per migliorare lo stato generale delle colture e potenziarne i naturali meccanismi di resistenza.
Contiene rame complessato con acido gluconico, un agente complessante naturale che favorisce un rapido assorbimento ed una veloce traslocazione degli elementi nutritivi attraverso la linfa, stimolando la fotosintesi e fungendo da potente anti-stress naturale per la pianta . Ciò consente di massimizzare i risultati già a bassi dosaggi.
KODENS Cu contiene inoltre Boro, che determina una maggiore lignificazione dei tessuti e un maggiore irrobustimento del fusto, aumentando la resistenza meccanica della pianta ai danni causati dagli stress biotici e abiotici.
La formula è completata dalla presenza di un'elevata quantità di biopolimeri naturali che garantiscono prontezza e persistenza d'azione. La formazione di un biofilm sulla parte trattata (pellicola traspirante biodegradabile), garantisce infatti la massima efficacia del trattamento anche nelle situazioni pedoclimatiche e agronomiche più difficili.
L'uso sistematico del prodotto induce una marcata azione elicitoria (produzione endogena di metaboliti secondari), responsabile di un aumento della resistenza naturale della coltura trattata allo sviluppo di funghi, batteri e virus.

COLTURA	MOMENTO DI APPLICAZIONE	DOSE/ETTARO*
Vite e Actinidia	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Olivo e Agrumi (Mandarino, Limone, Clementina, Bergamotto, Arancio)	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Nocciolo e Noce	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Drupacee (Susino, Pesco, Nettarina, Ciliegio, Albicocco) e Pomacee (Pero, Melo, Cotogno)	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Fragola	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Orticole da frutto (Zucca, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Melone, Melanzana, Cetriolo, Anguria)	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Orticole da foglia (Spinacio, Sedano, Scarola, Rucola, Radicchio, Lattuga, Cicoria)	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Colture industriali (Soia, Pomodoro da industria, Girasole, Cotone, Colza, Canna da zucchero, Barbabietola, Tabacco)	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Colture floricole ed ornamentali	Durante tutto il ciclo della coltura ad intervalli di 15-20 giorni	1-1,5 kg
Semenzai e Vivai	Durante tutto il ciclo della coltura	1-1,5 kg

COMPOSIZIONE	
Boro (B) totale	0.20%
Boro (B) solubile in acqua	0.20%
Rame (Cu) totale	5.5%
Rame (Cu) solubile in acqua	5.5%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
POLVERE SOLUBILE	
pH (sol 1%)	5.3
Conducibilità E.C. µS/cm (1‰)	402
MODO D'USO	
	Concimazione Fogliare

CONFEZIONE: 1 KG

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.